

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Lineamientos para el control de la glucemia y albuminuria en pacientes con nefropatía diabética en primer y segundo nivel de atención en Colombia. Panel nacional de expertos

Adriana Medina¹, Carlos Olivares¹, Carolina Sandoval-Salinas², Carlos Rosselli¹, Rafael Barón¹, Diego Ocampo¹, Alejandro Pinzón-Tovar³, Oswaldo Rincón⁴, Iván Villegas⁵ y Álvaro Fortich⁶

¹Hospital de San José Bogotá; ²Instituto para la Evaluación de la Calidad y la Atención en Salud-IECAS; ³Hospital Universitario de Neiva; ⁴Hospital Militar Central; ⁵Nefrodiálisis, S.A.; ⁶Asociación Colombiana de Endocrinología Cartagena, Colombia

RESUMEN

Antecedentes: La nefropatía diabética es una complicación microvascular frecuente en pacientes con diabetes de tipo 1 y de tipo 2 de larga evolución. Aproximadamente el 40% de las personas con diabetes presentarán en algún momento esta complicación. **Objetivo:** Proporcionar lineamientos a médicos generales y especialistas, profesionales de laboratorios clínicos y enfermería, para el control glucémico y de la proteinuria en pacientes con nefropatía diabética en centros asistenciales de primer y segundo nivel de atención en Colombia. **Metodología:** Especialistas clínicos formularon preguntas sobre el manejo de la nefropatía diabética, y priorizaron cinco de ellas dirigidas al diagnóstico de esta enfermedad y el control de la glucemia y albuminuria. Posteriormente se hizo una búsqueda no sistemática de literatura en las bases de datos

ABSTRACT

Background: Diabetic nephropathy is a common microvascular complication in patients with long-term type 1 or 2 diabetes. It is estimated that approximately 40% of diabetics will develop this complication. Nowadays, several interventions for glycemic control and reduction of proteinuria are available, inducing variability in clinical practice. **Objective:** To provide a guide to general practitioners, specialists, nurses and laboratory professionals for the glycemic control and reduction of proteinuria in patients with diabetic nephropathy in first and second level centers in Colombia. **Methods:** An expert panel was performed. Clinical specialists prioritized five clinic questions about glycemic and albuminuria control in patients with diabetic nephropathy. High-quality evidence was searched and reviewed for epidemiologists

Correspondencia:

*Carolina Sandoval-Salinas
E-mail: carolina.sandoval@iecas.org

Fecha de recepción: 22-03-2016
Fecha de aceptación: 29-08-2017
DOI: 10.24875/ALAD.17000236