



Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y Cuello

www.revista.acorl.org



Trabajos originales

Manejo quirúrgico para los desarreglos internos de la articulación temporomandibular: una alternativa con resultados promisorios.

Surgical management for internal derangement of the temporomandibular joint: an alternative with promising results.

Pinzón Navarro Martín*, Pedraza Alarcón Rene*, Peña Naranjo Juan**, Rubio Santos Daniella***

* Médico, Otorrinolaringólogo y Cirujano Maxilofacial. Profesor asociado, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hospital de San José. Bogotá DC, Colombia.

** Médico, Otorrinolaringólogo y Cirujano Maxilofacial. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hospital de San José. Bogotá DC, Colombia.

*** Médico, Estudiante de postgrado de Otorrinolaringología. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hospital de San José. Bogotá DC, Colombia.

Forma de citar: Pinzón-Navarro M, Pedraza-Alarcón R, Peña-Naranjo J, Rubio-Santos D. Manejo quirúrgico para los desarreglos internos de la articulación temporomandibular: una alternativa con resultados promisorios. Acta otorrinolaringol. cir. cabeza cuello. 2018;46(1):27-31

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido: 16 de agosto de 2017

Evaluado: 26 de octubre de 2017

Aceptado: 12 de diciembre de 2017

Palabras clave (DeCS):

Trastornos de la Articulación Temporomandibular, Disco de la Articulación Temporomandibular, Cirugía Ortognática.

RESUMEN

Objetivo. Describir las características clínicas y quirúrgicas de un grupo de pacientes con diagnóstico de disfunción de articulación temporomandibular (ATM) llevados a manejo quirúrgico. **Diseño del estudio:** Se realizó un estudio observacional descriptivo. **Materiales y métodos:** Se evaluaron las características clínicas y quirúrgicas de un grupo de pacientes con disfunción de ATM llevados a manejo quirúrgico con un periodo de seguimiento de uno y tres meses en el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital de San José de Bogotá. Se incluyeron 110 articulaciones a las cuales se les realizó una o varias de las siguientes cirugías: meniscopexia, eminectomía y condilectomía. Se realizó estadística descriptiva utilizando medidas de tendencia central, de dispersión, frecuencias absolutas y relativas. **Resultados.** La mayoría de los pacientes con síntomas clínicos tuvieron hallazgos anormales en resonancia magnética. El 90,6% y el 91% de los pacientes presentaron ausencia de dolor y ruido articular respectivamente. De igual forma se evidenció mejoría en la movilidad de la mandíbula. **Conclusión.** La cirugía para los desarreglos internos de la ATM es una cirugía segura con resultados muy favorables en nuestra población.

Correspondencia:

Daniella Rubio Santos

Correo electrónico: daniella.rubio1204@gmail.com

Carrera 19 # 8A-32. Bogotá D.C. Hospital de San José. Bogotá, Colombia.