



REPORTE DE CASO

Seudotumor inflamatorio secundario a palillo/mondadientes en paciente con carcinoma renal. Reporte de caso



CrossMark

Alvaro Cuellar^{a,*}, Alba Cáceres^b, Alejandra Malpica Veira^c,
Eduardo Rendón Fergusson^d y Carlos Alberto Castro Moreno^e

^a Médico, Urólogo, Oncólogo, Servicio de Urología Oncológica, Hospital San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

^b Médica, Uróloga. Servicio de Urología, Hospital San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

^c Estudiante de XI semestre, Facultad de Medicina, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

^d Médico, Residente, Urología primer año, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

^e Médico, Epidemiólogo, Profesor asistente, División de Investigaciones-Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Recibido el 31 de octubre de 2014; aceptado el 2 de diciembre de 2015

Disponible en Internet el 10 de febrero de 2016

PALABRAS CLAVE

Palillo/mondadientes;
Cuerpos extraños;
Seudotumor;
Ingesta;
Lesiones

Resumen

Objetivo: Describir las características clínicas, quirúrgicas y de manejo de un paciente con diagnóstico de carcinoma renal con hallazgo incidental de masa adherencial secundaria a cuerpo extraño (palillo o mondadientes).

Métodos: Se identificó el caso de un paciente masculino de 60 años de edad quien acudió al servicio de urgencias por presentar dolor lumbar tipo cólico de 3 años de evolución asociado a hematuria de un año de evolución; fue llevado a nefrectomía radical derecha. Durante la exploración quirúrgica se observaron importantes adherencias de asas delgadas, con sospecha en su momento de proceso metastásico, sin embargo, se identificó un cuerpo extraño correspondiente a un palillo ubicado en el meso con plastrón. Se describió el caso, se realizó una búsqueda de la literatura en la base de datos Pubmed y Medline con la cual se sustentó la discusión.

Resultados: Paciente de 60 años con carcinoma renal de células claras, grado nuclear Furhman 2 de aproximadamente 15 cm y proceso adherencial del intestino delgado secundario a cuerpo extraño (palillo). Fue llevado a nefrectomía radical, se le realizó liberación de adherencias y se retiró el cuerpo extraño; presentó adecuada evolución de su cuadro clínico, con mejoría de los síntomas de ingreso.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: alcuto74@hotmail.com (A. Cuellar).